






## I consigli del tuo farmacista per un'IGIENE ORALE personalizzata

		 <b>Spazzolini</b>	 <b>Monociuffo</b>	 <b>Fili Interdentali</b>	 <b>Scovolini</b>	 <b>Collutori</b>
 <b>Prevenzione</b>	<p>Usalo 2 o 3 volte al giorno, meglio se immediatamente dopo i pasti. Preferibilmente scegli spazzolini a setola media o morbida.</p>	<p>Usalo in aggiunta allo spazzolino per raggiungere quelle zone difficilmente accessibili.</p>	<p>Usa il filo interdentale almeno una volta al giorno dopo aver spazzolato i denti. Con spazi interdentali stretti e/o denti sovrapposti utilizza un filo Cerato. Con spazi normali e denti non sovrapposti puoi utilizzare un filo non cerato.</p>	<p>Usa quotidianamente scovolini dal diametro appropriato allo spazio tra dente e dente, con attenzione. Non forzare dove gli spazi interdentali non sono sufficientemente grandi e lo scovolino fa troppa fatica ad entrare.</p>	<p>Usa quotidianamente un collutorio contenente principi attivi che inibiscono la formazione della placca (oli essenziali, clorexidina a bassa concentrazione) e anticarie (fluoro). Privilegia un collutorio senza alcool</p>	
 <b>Gengivite</b>	<p>Usalo almeno 2 o 3 volte al giorno meglio se immediatamente dopo i pasti. Da evitare assolutamente spazzolini a setola dura.</p>	<p>Usalo in aggiunta allo spazzolino per raggiungere quelle zone difficilmente accessibili.</p>	<p>Usa il filo interdentale almeno una volta al giorno dopo aver spazzolato i denti. Con spazi interdentali stretti e/o denti sovrapposti utilizza un filo Cerato. Con spazi normali e denti non sovrapposti puoi utilizzare un filo Non cerato o Spugnato.</p>	<p>Usa quotidianamente scovolini dal diametro appropriato allo spazio tra dente e dente, con attenzione. Non forzare dove gli spazi interdentali non sono sufficientemente grandi e lo scovolino fa troppa fatica ad entrare.</p>	<p>Usa ciclicamente un collutorio con principi attivi indicati per combattere i batteri e inibire la formazione della placca (clorexidina). L'effetto è ottimale se associato alle terapie del dentista. Privilegia un collutorio senza alcool</p>	
 <b>Paradontite Piorrea</b>	<p>Usalo almeno 2 o 3 volte al giorno meglio se immediatamente dopo i pasti. Da evitare assolutamente spazzolini a setola dura.</p>	<p>Usalo in aggiunta allo spazzolino per raggiungere quelle zone difficilmente accessibili.</p>	<p>Usa il filo interdentale almeno una volta al giorno dopo aver spazzolato i denti. Sono consigliati fili speciali dal diametro maggiorato e con una sezione spugnata.</p>	<p>Usa quotidianamente scovolini dal diametro appropriato allo spazio tra dente e dente, con attenzione. Non forzare dove gli spazi interdentali non sono sufficientemente grandi e lo scovolino fa troppa fatica ad entrare.</p>	<p>Usa ciclicamente un collutorio con principi attivi indicati per combattere i batteri e inibire la formazione della placca (clorexidina 0,12%-0,20%). L'effetto è ottimale se associato alle terapie del dentista. Privilegia un collutorio senza alcool.</p>	
 <b>Afte Irritazioni</b>	<p>Usalo 2 o 3 volte al giorno, meglio se immediatamente dopo i pasti. Preferibilmente scegli spazzolini a setola media o morbida.</p>	<p>Usalo in aggiunta allo spazzolino per raggiungere quelle zone difficilmente accessibili.</p>	<p>Usa il filo interdentale almeno una volta al giorno dopo aver spazzolato i denti. Con spazi interdentali stretti e/o denti sovrapposti utilizza un filo Cerato. Con spazi normali e denti non sovrapposti puoi utilizzare un filo non cerato.</p>	<p>Usa quotidianamente scovolini dal diametro appropriato allo spazio tra dente e dente, con attenzione. Non forzare dove gli spazi interdentali non sono sufficientemente grandi e lo scovolino fa troppa fatica ad entrare.</p>	<p>Usa al bisogno un collutorio con principi attivi antinfiammatori per combattere l'irritazione e /o anestetici per lenire il dolore. Privilegia un collutorio senza alcool.</p>	
 <b>Denti sensibili</b>	<p>Usalo 2 o 3 volte al giorno, meglio se dopo i pasti. Scegli spazzolini a setola morbida o extramorbida.</p>	<p>Usalo in aggiunta allo spazzolino per raggiungere quelle zone difficilmente accessibili.</p>	<p>Usa il filo interdentale almeno una volta al giorno dopo aver spazzolato i denti. Con spazi interdentali stretti e/o denti sovrapposti utilizza un filo Cerato. Con spazi normali e denti non sovrapposti puoi utilizzare un filo non cerato.</p>	<p>Usa quotidianamente scovolini dal diametro appropriato allo spazio tra dente e dente, con attenzione. Non forzare dove gli spazi interdentali non sono sufficientemente grandi e lo scovolino fa troppa fatica ad entrare.</p>	<p>Usa al bisogno un collutorio al fluoro indicato per il trattamento dei diversi livelli e tipologie di ipersensibilità. Privilegia un collutorio senza alcool.</p>	
 <b>Impianti dentali corone o ponti</b>	<p>Usalo 2 o 3 volte al giorno integrandolo con l'azione dello scovolino o filo interdentale. Preferibilmente scegli spazzolini a setola media o morbida.</p>	<p>Usalo in aggiunta allo spazzolino per raggiungere quelle zone difficilmente accessibili.</p>	<p>Usa il filo interdentale almeno una volta al giorno dopo aver spazzolato i denti. Sono consigliati fili speciali dal diametro maggiorato e con una sezione spugnata.</p>	<p>Devi utilizzare quotidianamente scovolini, meglio se con anima rivestita in plastica, per non danneggiare le superfici degli impianti. Non forzare dove gli spazi tra i denti o tra gli impianti non sono sufficientemente grandi e lo scovolino fa troppa fatica ad entrare.</p>	<p>Può essere consigliato usare ciclicamente un collutorio con principi attivi indicati per combattere i batteri e inibire la formazione della placca (oli essenziali, clorexidina 0,12%-0,20%). Privilegia un collutorio senza alcool.</p>	